

Académie : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Département : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	Date de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	
Fiche établie pour la période suivante : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	

Dès les premiers signes, **faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.**

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements, diarrhée, fièvre Refus du repas Comportement inhabituel	Appel des parents	Donner une ampoule de G30% puis voir avec les parents pour la suite de la prise en charge / !\ Ne pas donner de jus de fruit ni gâteau pour le resucrage

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements itératifs Signes d'hypoglycémie (sueurs, pâleur, fatigue, tremblements...) Trouble de conscience	Appel 15 et parents. Préciser au SAMU que l'enfant est suivi pour une maladie métabolique à risque d'hypoglycémie	En l'absence de trouble de conscience : donner 1 ampoule de glucosé 30% Transmettre le protocole d'urgence au SAMU

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informé.

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courrier joint : OUI

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :