

Académie : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Département : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	Date de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	
Fiche établie pour la période suivante : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	

Dès les premiers signes, **faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.**

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Dans une situation possible de consommation importante d'aliments contenant du fructose :	Appel des parents	
- douleurs abdominales - vomissements récurrents	Appel des parents	Aucun à l'école Ne pas donner de produit sucré (jus de fruits, compote...) ni sucre (morceau, dosette)

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Hypoglycémies (sueurs, pâleur, maux de tête, vertige, fatigue, tremblements...)	Appel 15 et parents. Préciser au SAMU que l'enfant est suivi pour une maladie métabolique à risque d'hypoglycémie	Transmettre le protocole d'urgence au SAMU (resucrage G30%)
Trouble de conscience, coma		Ne pas donner de produit sucré (jus de fruits, compote...) ni sucre (morceau, dosette)

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informé.

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courrier joint : OUI

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :