

Académie : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Département : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

### 3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	Date de naissance : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Numéros d'urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	
Fiche établie pour la période suivante : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Hypoglycémie : signes possibles :  Pâleur, Sueurs, Tremblements, Fatigue soudaine, Difficultés pour parler, Somnolence, Agitation, Agressivité inhabituelle, Vertiges, Vision floue ou double, Fourmillements...	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faire s'asseoir l'enfant</li><li>• Contrôler la glycémie capillaire (le dextro)</li></ul>	
	Glycémie capillaire : - si < 60 mg/dL = hypoglycémie	... sucres en morceau/dosette OU ... ampoules de GLUCOSE 30% (1 sucre ou 1 ampoule G30% pour 20kg) contrôler la glycémie 5 minutes plus tard. Si toujours <60mg/dL, resucrer à nouveau Dès que glycémie > 60mg/dL : donner une collation (biscuits, pain, madeleine...)
	Glycémie capillaire : - si >60mg/dL : pas d'hypoglycémie	Pas de resucrage Contrôler 15 minutes plus tard si les signes persistent.
	Dans tous les cas : - Appel des parents - <i>Si la réalisation de glycémies capillaires n'est pas possible, considérer le malaise comme étant une hypoglycémie et resucrer toutes les 5 minutes, 3 fois de suite, tant que retour à la pleine conscience non obtenue, puis proposer une collation (biscuit, pain ...)</i>	

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perte de connaissance</li> <li>- Troubles importants de la conscience</li> <li>- Crise convulsive</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appel du SAMU</li> <li>- Ne rien donner dans la bouche</li> <li>- Contrôle de la glycémie (dextro)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si glycémie capillaire &lt; 60 mg/dl : → Injecter en sous-cutané ou intramusculaire 1 mg = 1ml de Glucagen (1 ampoule) → ou 1 pulvérisation nasale de Baqsimi</li> <li>- donner le protocole d'urgence au SAMU pour le perfuser en sucre</li> </ul>

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.

**Contenu de la trousse d'urgence :**

- lecteur glycémique avec bandelettes, lancettes et autopiqueur.
- sucre rapide (pour normaliser la glycémie) : ampoule de G30% ou sucres en morceaux ou jus de fruit ou Glucopulse
- sucre lent (pour maintenir la glycémie une fois sa normalisation) : biscuits, bouts de pain, madeleine...
- Glucagen : 1 ampoule

***Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courrier joint :  OUI***

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :