

Académie :

Département :

### 3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D’URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom :	Date de naissance :
Numéros d’urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d’urgence de l’enfant ainsi qu’un téléphone portable.

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d’appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements, diarrhée, fièvre Refus du repas	Appel des parents	Proposer une boisson sucrée en attendant les parents puis voir avec eux pour la suite de prise en charge
Comportement inhabituel		
Prise d’un aliment interdit (viande, poisson, oeuf, produit laitier, produit céréalier)	surveiller si apparition de vomissements, troubles du comportement, troubles de la conscience + prévenir immédiatement les parents (pour ajustement du régime à domicile)	Aucun à l’école

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d’appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Signes d’hypoglycémie (sueurs, pâleur, fatigue, tremblements...)	Appel 15 et parents. Préciser au SAMU que l’enfant est suivi pour une maladie métabolique à risque d’hypoglycémie	En l’absence de trouble de conscience : donner 1 ampoule de glucosé 30% Transmettre le protocole d’urgence aux secours
Trouble de conscience		

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informer.

**Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l’attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courier joint :  OUI**

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :