

Académie :

Département :

3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D’URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom :	Date de naissance :
Numéros d’urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante :	

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d’urgence de l’enfant ainsi qu’un téléphone portable.

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d’appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
	<ul style="list-style-type: none">• Faire s’asseoir l’enfant• Contrôler la glycémie capillaire (le dextro)	
Hypoglycémie : signes possibles : Pâleur, Sueurs, Tremblements, Fatigue soudaine, Difficultés pour parler, Somnolence, Agitation, Agressivité inhabituelle, Vertiges, Vision floue ou double, Fourmillements...	Glycémie capillaire : - si < 60 mg/dL = hypoglycémie	... sucres en morceau/dosette OU ... ampoules de GLUCOSE 30% (1 sucre ou 1 ampoule G30% pour 20kg) contrôler la glycémie 5 minutes plus tard. Si toujours <60mg/dL, resucrer à nouveau Dès que glycémie > 60mg/dL : donner une collation (biscuits, pain, madeleine...)
	Glycémie capillaire : - si >60mg/dL : pas d’hypoglycémie	Pas de resucrage Contrôler 15 minutes plus tard si les signes persistent.
	Dans tous les cas : - Appel des parents - <i>Si la réalisation de glycémies capillaires n'est pas possible, considérer le malaise comme étant une hypoglycémie et resucrer toutes les 5 minutes, 3 fois de suite, tant que retour à la pleine conscience non obtenue, puis proposer une collation (biscuit, pain ...)</i>	

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d'appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
<ul style="list-style-type: none"> - Perte de connaissance - Troubles importants de la conscience - Crise convulsive 	<ul style="list-style-type: none"> - Appel du SAMU - Ne rien donner dans la bouche - Contrôle de la glycémie (dextro) 	<ul style="list-style-type: none"> - Si glycémie capillaire < 60 mg/dl : <ul style="list-style-type: none"> → Injecter en sous-cutané ou intramusculaire 1 mg = 1ml de Glucagen (1 ampoule) → ou 1 pulvérisation nasale de Baqsimi - donner le protocole d'urgence au SAMU pour le perfuser en sucre

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informée.

Contenu de la trousse d'urgence :

- lecteur glycémique avec bandelettes, lancettes et autopiqueur.
- sucre rapide (pour normaliser la glycémie) : ampoule de G30% ou sucres en morceaux ou jus de fruit ou Glucopulse
- sucre lent (pour maintenir la glycémie une fois sa normalisation) : biscuits, bouts de pain, madeleine...
- Glucagen : 1 ampoule

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l'attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courier joint : OUI

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :

<i>Centre de référence maladies héréditaires du métabolisme hépatique Hôpital Tél :</i>
